

ADIÇÃO DE REDUTORES DE PH E DOSES DE GLYPHOSATE NA DESSECAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS

SOUZA, Fábio Dener¹
ISHIDA, Willians Yoshi Fumi²
MEDICE, Regiane³

¹ Aluno do curso de Agronomia da Associação Cultural e Educacional de Itapeva
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias

² Aluno do curso de Agronomia da Associação Cultural e Educacional de Itapeva
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias

³ Professor orientador da Associação Cultural e Educacional de Itapeva
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias

Resumo

Foram conduzidos dois experimentos visando avaliar a influência de redutores de pH e doses de glyphosate associados à calda de pulverização sobre a dessecação de *Euphorbia heterophylla* (Amendoim-bravo) e *Glycine max* (Soja tiguera). Adotou-se o esquema fatorial $(4 \times 2) + 1$, em blocos casualizados com quatro repetições. Foi utilizado um redutor comercial em cada experimento (pH Fós ou Redumax), sendo quatro doses do redutor (0, 50, 75 e 100% da dose recomendada pelo fabricante) e duas doses de glyphosate (450 e 900 g ha⁻¹), além de uma testemunha sem aplicação. O controle das plantas daninhas foi avaliado aos 4, 6, 8, 10, 12 e 14 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos, em escala visual de 0 a 100% de controle. Em ambos os experimentos, na dose de 450 g ha⁻¹ de glyphosate, a adição de redutores à calda de pulverização proporcionou maior controle das plantas daninhas, em relação ao uso de glyphosate isolado. Não houve diferenças no desempenho proporcionado pelas quantidades de 50, 75 e 100% da dose recomendada dos redutores, em todas as avaliações. Constatou-se ainda que aos 14 DAA, o uso de adjuvante permitiu um controle satisfatório com metade da dose de glyphosate recomendada. Tais resultados evidenciam a possibilidade de redução na dose de glyphosate quando forem utilizados esses adjuvantes.

Palavras-chave: Adjuvantes, doses reduzidas, herbicida, manejo.

Abstract

Two experiments were conducted to evaluate the influence from the addition of pH reducers and rates of glyphosate in the spray mix to *Euphorbia heterophylla* and *Glycine max* control. The treatments were arranged in a factorial scheme $(4 \times 2) + 1$, randomized blocks design and four replications. Each experiment used a pH reducer (pH Fós ou Redumax), four rates of reducer (0, 50, 75 and 100% of the rate recommended), two rates of glyphosate (450 and 900 g ha⁻¹) and an untreated check. The weed control was evaluated

at 4, 6, 8, 10, 12 and 14 days after application (DAA) of treatments, in visual scale from 0 to 100% of control. In both experiments, 450 g ha⁻¹ glyphosate, the addition of reducers in the spray mix provided greater weed control in relation to only glyphosate. There was no difference in 50, 75 and 100% of the rate recommended of reducers. With the use of adjuvant has a satisfactory control with half the recommended rate of glyphosate at 14 DAA. These results demonstrate the possibility of reduced rates of glyphosate when used these adjuvants in the spray mix.

Keywords: Adjuvants, reduced rates, herbicide, management.

1. Introdução

Planta daninha é qualquer espécie vegetal que cresce onde não é desejado, sendo que quando crescem juntamente com as culturas agrícolas interferem no seu desenvolvimento reduzindo-lhes a produção (LORENZI, 2006); competem pela extração dos fatores de produção: água, luz, CO₂ e nutrientes e exercem inibição química sobre o desenvolvimento das plantas, fenômeno esse conhecido como “alelopatia” (CARVALHO et. al., 2001).

Alguns estudos indicam que a redução no valor do pH na calda de pulverização tem sido uma prática promissora para melhorar a absorção do herbicida, o que permite reduzir as doses dos produtos e dos custos de produção, mantendo eficiente nível de controle (Carlson & Burnside, 1984; Azevedo, 2001; Vargas & Bortolozzo, 2001; Sanchotene et al., 2007). Segundo Sanchotene et al. (2007), herbicidas dissolvidos em condições de baixo pH podem ser absorvidos com maior facilidade pelas plantas, visto que as moléculas encontram-se na forma não-dissociada.

Para a redução do pH na calda de pulverização é usado comumente ácido fosfórico, tendo várias marcas comerciais disponibilizadas no mercado (Azevedo, 2001). Uma outra alternativa que visa melhorar a eficiência dos herbicidas é a adição de sulfato de amônia ou uréia na calda de pulverização. Esse processo auxilia a passagem das moléculas na cutícula, fazendo com que o herbicida penetre facilmente na epiderme da folha, além de evitar o escorrimento do produto sobre a folha (Pitelli, 1985).

De acordo com Galli & Montezuma (2005), o glyphosate apresenta a melhor eficiência com a água a pH 3,5. Costa et al. (2005) também verificaram que a adição de adjuvantes na solução de glyphosate melhorou o espalhamento da gota de pulverização nas superfícies foliares, capacidade atribuída à redução na tensão superficial da solução, aumentando

do a área de contato da gota com a epiderme da folha. Apesar dos relatos indicarem que a diminuição do pH na calda do glyphosate é uma prática positiva, praticamente não há informações concretas referentes à utilização de redutores de pH visando aumentar a eficiência no controle das plantas daninhas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência de redutores de pH utilizados na calda de pulverização sobre duas doses de glyphosate na dessecação de plantas daninhas.

2. Revisão Literária

Os experimentos foram conduzidos em Araruna (PR), latitude 24°01'55"S e longitude 52°42'59"W, altitude de 424 m, região centro ocidental do Paraná. A região apresenta temperatura média anual de 26°C, precipitações pluviométricas anual de 1200 mm e umidade relativa média do ar de 56% (COAMO, 2006).

Tabela 1. Características químicas da amostra de água no local de abastecimento. Araruna, PR, 2006.

pH	Alcalinidade CaCO ₃ (mg L ⁻¹)	Dureza Total CaCO ₃ (mg L ⁻¹)	Bicarbonatos CaCO ₃ (mg L ⁻¹)	Cálcio (mg L ⁻¹)	Magnésio (mg L ⁻¹)	Ferro (mg L ⁻¹)	Alumínio (mg L ⁻¹)
6,87	34,0	26,7	34,0	7,01	2,24	1,02	0,167

Fonte: Laboratório Santa Rita, Mamborê, PR.

Nos experimentos foi adotado o esquema fatorial (4 x 2) + 1, em blocos casualizados com quatro repetições, sendo que para cada experimento foi utilizado um redutor de pH (Tabela 2). Os tratamentos resultaram na combinação de quatro doses do redutor (0, 50, 75 e 100% da dose recomendada pelo fabricante) e duas doses de glyphosate (450 e 900 g ha⁻¹), além de uma testemunha sem herbicida (Tabela 3). A área de cada parcela experimental foi de 30 m² (5 x 6 m), totalizando 36 parcelas em cada experimento.

As avaliações de controle dos tratamentos sobre as plantas daninhas foram realizadas aos 4, 6, 8, 10, 12 e 14 DAA, com base em escala visual de 0 a 100% de controle. Os resultados foram submetidos a análise de variância, quando constatada significância estatística, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (SAEG, 1997).

Os dados do experimento 1, referentes ao controle de plantas daninhas após a aplicação dos diferentes tratamentos, são apresentados na Tabela 4. Independentemente da época de avaliação, verificou-se que o uso de pH Fós proporcionou os melhores controles das espécies, nos tratamentos que receberam a menor dose de glyphosate (450 g ha⁻¹).

Para a dose 900 g ha⁻¹, não houve diferença significativa entre os tratamentos químicos, sendo todos esses superiores à testemunha (Tabela 4). Portanto, a utilização do pH Fós

na calda de pulverização não influenciou o controle de *E. heterophyla* e *G.max* na dose recomendada.

Quando em presença de adjuvante, Vargas & Roman (2006) também observaram melhores resultados no controle de plantas daninhas com a redução de até 50% na dose de herbicidas, comparativamente àquelas sem a adição de adjuvantes. Stougaard (1997) relata que os redutores de pH são acrescentados à calda de pulverização com o intuito de melhorar a eficiência das pulverizações foliares de herbicidas, reduzir o impacto das interferências ambientais e permitir uma penetração cuticular mais eficiente. Ao analisar os tratamentos nos quais foram adicionados 6, 9 e 12 mL de ha-1 do pH Fós, observou-se que não houve diferenças significativas no controle das plantas daninhas, independente da quantidade de glyphosate aplicada (Tabela 4).

Resultados semelhantes ao experimento 1 também foram constatados no experimento 2, com a utilização do Redumax (Tabela 5). Portanto, todos os tratamentos nos quais se adotou a dose recomendada de glyphosate não apresentaram diferenças significativas nas diferentes épocas avaliadas, independente da quantidade adicionada do Redumax.

Tabela 2. Características dos redutores de pH utilizados nos experimentos. Araruna, PR, 2006.

Experimento	Nome Comercial	Composição Química	Fabricante	Dose (L)*
1	pH Fós	Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúvel em (CNA + água) (50%); Densidade 1,60; N total (1%)	Quimifol	0,06
2	Redumax	Pentóxido de fósforo P ₂ O ₅ solúvel em (CNA + água) (30%), Densidade 1,42; (complexante), N total (3%).	Forquímica	0,12

*Quantidade recomendada pelo fabricante a cada 1000 L de calda para pulverização.

Tabela 3. Tratamentos, doses e pH inicial da calda de pulverização utilizados nos do experimentos. Araruna, PR, 2006.

Experimento	Tratamento	Dose (ha ⁻¹)	pH inicial da calda*
1	Testemunha	-	-
	pH Fós + Glyphosate**	0 + 450 g	6,8
	pH Fós + Glyphosate	6 mL + 450 g	6,0
	pH Fós + Glyphosate	9 mL + 450 g	5,0
	pH Fós + Glyphosate	12 mL + 450 g	3,8
	pH Fós + Glyphosate	0 + 900 g	6,8
	pH Fós + Glyphosate	6 mL + 900 g	6,0
	pH Fós + Glyphosate	9 mL + 900 g	5,0
2	Testemunha	-	-
	Redumax + Glyphosate	0 + 450 g	6,8
	Redumax + Glyphosate	12 mL + 450 g	6,0
	Redumax + Glyphosate	18 mL + 450 g	5,3
	Redumax + Glyphosate	24 mL + 450 g	4,0
	Redumax + Glyphosate	0 + 900 g	6,8
	Redumax + Glyphosate	12 mL + 900 g	6,0
	Redumax + Glyphosate	18 mL + 900 g	5,3
	Redumax + Glyphosate	24 mL + 900 g	4,0

*Valor após a adição do redutor, mas antes de acrescentar o glyphosate. Após a adição de glyphosate, os valores na calda variaram entre pH 3,6 e 3,9. **Glyphosate (Foi utilizado o produto comercial Round up Original).

Tabela 4. Porcentagem de controle de *E. heterophylla* e *G. max* aos 4, 6, 8, 10, 12 e 14 dias após a aplicação de diferentes tratamentos. Experimento 1. Araruna, PR, 2006.

Dose de glyphosate (g ha ⁻¹)	Tratamentos					C. V. (%)
	Testemunha	Glyphosate (pH 6,85)	pH Fós + Glyphosate (pH 6,0)	pH Fós + Glyphosate (pH 5,0)	pH Fós + Glyphosate (pH 3,8)	
% de controle aos 4 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	15 Aa	15 Aa	15 Aa	15 Aa	14,1
450	0 Ab	0 Bb	2 Ba	2 Ba	2,3 Ba	
% de controle aos 6 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	30 Aa	35 Aa	30 Aa	30 Aa	8,7
450	0 Ab	0 Bb	15 Ba	10 Ba	15 Ba	
% de controle aos 8 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	50 Aa	52 Aa	50 Aa	45 Aa	14,9
450	0 Ab	0 Bb	25 Ba	30 Ba	32 Ba	
% de controle aos 10 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	75 Aa	70 Aa	72 Aa	75 Aa	12,7
450	0 Ab	0 Bb	50 Ba	45 Ba	50 Ba	
% de controle aos 12 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	95 Aa	95 Aa	98 Aa	100 Aa	17,1
450	0 Ab	0 Bb	70 Ba	75 Ba	75 Ba	
% de controle aos 14 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	95 Aa	100 Aa	100 Aa	95 Aa	13,3
450	0 Ab	0 Bb	90 Aa	95 Aa	95 Aa	

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 5. Porcentagem de controle de *E. heterophylla* e *G. max* aos 4, 6, 8, 10, 12 e 14 dias após a aplicação de diferentes tratamentos. Experimento 2. Araruna, PR, 2006.

Dose de glyphosate (g ha ⁻¹)	Tratamentos					C. V. (%)
	Testemunha	Glyphosate (pH 6,85)	Redumax + Glyphosate (pH 6,0)	Redumax + Glyphosate (pH 5,0)	Redumax + Glyphosate (pH 3,8)	
% de controle aos 4 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	15 Aa	15 Aa	15 Aa	15 Aa	10,4
450	0 Ab	0 Bb	2 Ba	2,3 Ba	2 Ba	
% de controle aos 6 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	30 Aa	28 Aa	30 Aa	28 Aa	11,3
450	0 Ab	0 Bb	18 Ba	15 Ba	18 Ba	
% de controle aos 8 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	50 Aa	50 Aa	45 Aa	50 Aa	6,1
450	0 Ab	0 Bb	30 Ba	32 Ba	30 Ba	
% de controle aos 10 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	75 Aa	70 Aa	75 Aa	70 Aa	15,1
450	0 Ab	0 Bb	52 Ba	50 Ba	52 Ba	
% de controle aos 12 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	95 Aa	95 Aa	100 Aa	95 Aa	13,7
450	0 Ab	0 Bb	70 Ba	75 Ba	70 Ba	
% de controle aos 14 dias após a aplicação dos tratamentos						
900	0 Ab	95 Aa	98 Aa	100 Aa	98 Aa	7,4
450	0 Ab	0 Bb	90 Aa	100 Aa	90 Aa	

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Em ambas as doses de glyphosate, não foi constatada diferença na eficiência de controle nos tratamentos aos 14 DAA com a adição do Redumax à calda de pulverização (Tabela 5). A partir desses dados, infere-se que é possível reduzir em até 50% a dose de glyphosate com o uso do Redumax, mantendo a mesma eficiência no controle. Com o intuito de avaliar o desempenho do glyphosate em mistura com adjuvantes, Pedrinho Junior et al. (2002) verificaram que as adições de uréia e sulfato de amônio potencializaram o efeito do herbicida em todas as avaliações visando a dessecação das plantas daninhas. No entanto, a adoção em maior escala da aplicação de doses reduzidas de herbicidas não tem evoluído devido ao risco de que as plantas daninhas poderiam sobreviver, produzir sementes para os anos seguintes e incrementar o banco de sementes no solo (Jones & Medd, 2000).

Outro aspecto importante foi verificado na Tabela 5, em que a quantidade do Redumax adicionada à calda de pulverização (12, 18 e 24 mL de ha⁻¹) não influenciou no controle de plantas daninhas. Por outro lado, considerando a dose de 450 g ha⁻¹ glyphosate, os tratamentos com o Redumax foram superiores em comparação ao uso de glyphosate isolado (Tabela 5). Alguns trabalhos (Pitelli, 1985; Vargas & Roman, 2006) indicam que o nitrogênio presente na composição dos redutores de pH pode favorecer a absorção da calda pela planta melhorando o desempenho do herbicida.

Ambos os redutores de pH avaliados nesse trabalho obtiveram resultados semelhantes. Nos tratamentos em que foram utilizadas doses reduzidas de glyphosate, o controle foi significativamente favorecido com a adição do pH Fós e do Redumax (Tabelas 4 e 5). Segundo Azevedo (2001), as gotas de pulverização emulsionadas com os redutores de pH tendem a evaporar de forma lenta e atingem seu alvo mais facilmente.

4. Conclusões

Considerando que o glyphosate é o herbicida de maior volume de vendas no mundo, com intenso uso por quase três décadas (Heap, 2008), a utilização deste produto em doses reduzidas poderá contribuir para minimizar a contaminação ambiental.

5. Referências

- AZEVEDO, L. S. **Proteção integrada de plantas com fungicidas**. São Paulo: EMOPI. 2001, 230p.
- BAIRD, D. D. Introduction of a new broad spectrum postemergent herbicide class with utility for herbaceous perennial weed control. **Proc. N. Cent. Weed Contr. Conf.**, v.26, p.64-68, 1971.
- CARLSON, K. L.; BURNSIDE, O. C. Comparative phytotoxicity of Glyphosate, SC-0224, SC-0545, and HOE-00661. **Weed Sci.**, v.32, p.841-844, 1984.
- COAMO - Agroindustrial Cooperativa. **Dados da Estação Meteorológica da COAMO**. 2006.
- CONSTANTIN, J.; OLIVEIRA JR., R. S.; CAVALIERI, S. D.; ARANTES, J. G. Z.; ALONSO, D. G.; ROSO, A. C.; COSTA, J.M. Interação entre sistemas de manejo e controle de plantas daninhas em pós-emergência afetando o desenvolvimento e a produtividade do milho. **Planta Daninha**, v.25, p.513-520, 2007.
- COSTA, N. V.; MARTINS, D.; RODELLA, R. A.; COSTA, L. D. N. C. pH foliar e deposição de gotas de pulverização em plantas daninhas aquáticas: *Brachiaria mutica*, *Brachiaria subquadripata* e *Panicum repens*. **Planta Daninha**, v.23, p.295-304, 2005.
- DEVLIN, D. L.; LONG, J. H.; MADDUX, L.D. Using reduced rates of post-emergence herbicides and soybeans (*Glycine max*). **Weed Tech.**, v.5, p.834-840, 1991.

GALLI, B. J. A.; MONTEZUMA, C. M. **Alguns aspectos da utilização do herbicida glyphosate na agricultura**. Monsanto do Brasil, 2005. 60p.

HEAP, I. 2008 **International Survey of Herbicide Resistant Weeds**. Online. Internet. 27 de Julho de 2008. Disponível em www.weedscience.org.

HETHERINGTON P. R.; REYNOLDS T. L.; MARSHALL, G.; KIRKWOOD, R. C. The absorption, translocation and distribution of the herbicide Glyphosate in maize expressing the CP-4 transgene. **J. Exp. Botany**, v.50, p.1567-1576, 1998.

JONES, R. E.; MEDD, R. W. Economic thresholds and the case for longer term approaches to population management of weeds. **Weed Tech.**, v.14, p.337- 350, 2000.

KING, C. A.; OLIVER, L. R. Application rate and timing acifluorfen, bentazon, chlorimuron, and imazaquin. **Weed Tech.**, v.6, p.526-534, 1992.

KLINGMAN, T. E.; KING, C. A.; OLIVER, L. R. Effect of application rate, weed species, and weed stage of growth on imazethapyr activity. **Weed Sci.**, v.40, p.227-232, 1992.

PEDRINHO JUNIOR, A. F. F.; PIVA, F. M.; MARTINI, G.; FELICI, G. V.; DURIGAN, J. C. Influência da chuva na eficácia do glyphosate em mistura com adjuvantes na dessecação de plantas daninhas. **Planta Daninha**, v.20, p.263-271, 2002.

PITELLI, R. A. Interferência das plantas daninhas em culturas agrícolas. **Inf. Agropec.**, n.11, 1985.

ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. **Introdução à química ambiental**. Porto Alegre: Bookman, 2004.

RODRIGUES, B. N.; ALMEIDA, F. L. S. **Guia de herbicidas**, 5.ed. Londrina: IAPAR, 2005. 592p.

RUITER, H.; MAINEN, E. Influence of water stress and surfactant on the efficacy, absorption, and translocation of glyphosate. **Weed Sci.**, v.46, p.289-296, 1998.

SAEG - **Sistema para Análises Estatísticas**: versão 7.0. Viçosa: Fundação Arthur Bernardes, 1997.

SANCHOTENE, D. M.; DORNELLES, H. B.; DEBORTOLI, M. P.; CAPITANIO, JR.; MEZZOMO, R. F.; GONÇALVES, R. A. Influência de sais e do pH da água na eficiência de imazethapyr + imazapic no controle de arroz-vermelho. **Planta Daninha**, v.25, p.415-419, 2007.

STOUGAARD, R. M. Adjuvant combinations with quizalofop for wild oat (*Avena fatua*) control in peppermint (*Mentha piperita*). **Weed Tech.**, v.11, p.45-50, 1997.